



Online punkten: Diesen Fragebogen finden Sie im Netz unter CME.springer.de. Hinweise zur Teilnahme gibt es auf Seite 48. Bitte beachten Sie: Die Reihenfolge der Fragen ist online individuell zusammengestellt. Die Teilnahme an der Fortbildung ist nur online möglich.

FRAGEBOGEN

Rupatadin

Rupatadin ist indiziert zur symptomatischen Behandlung von:

- Neurodermitis
- Sinusitis
- Asthma
- Lebensmittelallergie
- Urtikaria

Welche tägliche Dosierung wird für Jugendliche und Erwachsene empfohlen?

- 5 mg
- 15 mg
- 30 mg
- 10 mg
- 20 mg

Die Wirkung von Rupatadin ...

- verursacht eine Bildung des plättchenaktivierenden Faktors.
- beruht auf einer Blockade von peripheren H1-Rezeptoren.
- hält nur kurzzeitig an.
- fördert die Degranulation der Mastzellen.
- beruht auf einer Hemmung der Serotoninaufnahme.

Welche Patientengruppe kann Rupatadin ohne Bedenken einnehmen?

- Jugendliche ab zwölf Jahre
- Patienten über 65 Jahre
- Patienten mit Hypcholesterinämie
- Patienten mit Herzrhythmusstörungen
- Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion

Welcher Arzneistoff hat keinen Einfluss auf den Histaminhaushalt?

- ASS
- Tramadol
- Ramipril
- Bisoprolol
- Diclofenac

Welches Medikament kann bedenkenlos mit Rupatadin eingenommen werden?

- Ketokonazol
- Penicillin
- Carbamazepin
- Simvastatin
- Erythromycin

Welche Nebenwirkungen treten unter der Behandlung von Rupatadin am häufigsten auf?

- Übelkeit und Erbrechen
- Obstipation und Verdauungsbeschwerden
- Somnolenz und Kopfschmerzen
- Sehstörungen
- Haarausfall

Durch welche Symptome wird eine allergische Rhinitis primär gekennzeichnet?

- klares Sekret, Niesen, Juckreiz
- Sinusitis
- Quaddeln und Angioödem
- Husten, Halsschmerzen
- Kopfschmerzen

Welche Methode ist zur Diagnostik der allergischen Rhinitis nicht geeignet?

- Prick-Test
- Patientenanamnese
- Provokationstest
- Differenzialblutbild
- SIT

Häufig sind verschiedene Allergene die Auslöser für die Urtikaria. Welche zählen eher nicht dazu?

- Medikamente
- Tumoren
- Wärme
- Autoantikörper
- Kälte